



Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الاسم العلمي: Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول أو معمر، جذوره مغزلية، سميكة، طولها 50-100 سم، أهلكس. الأوراق السفلى مجزأة ريشية، يصل طولها 15 سم، الفصوص رمية ذات تفصص قليل أو تسنن غير منتظم. الأوراق الساقية لاطئة، قواعد لها زائدتين طويلتين ملتحمتين بالساق لأسفل بطول 1-2 سم، الأوراق العلوية رمية-مثلثة، مدببة. الهامات عديدة، طرفية وجانبية، طولها 12 مم، متطاولة تحتوي على 5 أزهار. القنابات الغلافية لينة، ملساء، عدة طبقات، حوافها غشائية الخارجية قصيرة،

الزهرة: بيضاء، الداخلية طويلة، شريطية. الأزهار صفراء، طولها 9 مم السبيلاء بنفسجية داكنة

الثمار: سوداء، رمية إلى اهليلجية ضيقة، مضغوطة، تحتوي على 7-9 خطوط على كل جانب، تضيق النوع من يرد في مونيرد ولكن حسب كيو النوع هو البديل أو المرادف للنوع viminea Scahola

توزيعها في العراق طويل بسوي طول الثمرة، الهناثير متساقطة.

مونيرد في الوارد P.W. Schmidt (L.)

التراب الحصى

موطن:

أشهر الإزهار: 9 8 7 6 5

حياة:

الانتهاء الجغرافي: توراني متوسطي إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011